

## CT enterografie

Enterografie je vyšetření tenkého střeva pomocí počítačové tomografie (CT).

Kontraindikace – alergie na jodovou kontrastní látku, ledvinné selhání.

Příprava pacienta na vyšetření:

- od půlnoci nejíst, nekouřit,
- na CT pracoviště přichází pacient hodinu před objednaným vyšetřením,
- s sebou vzít žádanku na vyšetření od indikujícího lékaře a informovaný souhlas pacienta s aplikací jodové kontrastní látky do žíly,
- na žádance musí být vyplněna alergie a výsledky ledvinných funkcí – UREA, KREA.

Příprava pacienta na CT pracovišti:

- pacient vypije během 45 min. po douškách 2 litry 2,5% Manitolu (slabého nevstřebatelného cukru),
- je zajištěna žíla (zavedena flexila) pro následné podání Buscopanu (přípravek pro zmírnění střevní peristaltiky) a jodové kontrastní látky,

Vyšetření se provádí vleže na zádech a trvá zhruba 10 minut. Po ukončení přípravy je pacient uložen na vyšetřovací stůl, je proveden náběr dat, včetně aplikace jodové kontrastní látky a Buscopanu..

Po vyšetření zůstane pacient ještě v čekárně se zajištěnou žilou. CT pracoviště opustí až po vyjmutí flexily.

Mohou se objevit vedlejší účinky Manitolu v podobě průjmu. S tím musí pacient počítat, pokud cestuje na delší vzdálenost.

Výsledky vyšetření jsou odeslány indikujícímu lékaři do týdne.