

Neurointervence pod CT - PRT, FD, opich SI skloubení

PRT – periradikulární terapie: ošetření drážděného nervového kořene v místě jeho výstupu z kanálu páteřního.

FD – fasetová denervace: ošetření drobných meziobratlových kloubů, jejichž změny dráždí nervová zakončení v okolí skloubení.

Opich SI skloubení: ošetření skloubení kosti křížové a kyčelní (sakroilický kloub) cílenou intraartikulární aplikací medikamentů.

Kontraindikace – alergie na jodovou kontrastní látku, Marcain, nespolupráce.

Příprava pacienta před vyšetřením:

- 4 hodiny nejíst,
- pacient přichází na CT pracoviště s žádanku na vyšetření od indikujícího lékaře a informovaným souhlasem pacienta, na žádance musí být vyplněna alergie a výsledky krvácivosti – srážlivosti (INR) pokud bere léky na ředění krve (u Anopirinu nemusí)

Pacient ulehá na vyšetřovací stůl na břicho, ruce pod hlavu. Důležitá je spolupráce pacienta. Následně je proveden topogram. Lékař se zaměří na indikovanou oblast a vybere nejvhodnější přístupové místo, které si označí na pacientovi a kde aplikuje léčebnou směs. Následuje kontrola rozložení této směsi. To celé trvá zhruba 20 minut.

U FD a opichu SI skloubení je vhodný doprovod.

U PRT JE NUTNÝ DOPROVOD A NÁSLEDNÝ ODVOZ (součástí léčebné směsi je anestetikum, klidový režim 24 hodin)

Výsledky dostane odesílající lékař do týdne.