

LÉKAŘKA ORL PŘÍBRAMSKÉ Nemocnice **ANDREA HUDECOVÁ** V ROZHоворУ VYSVĚTЛUJE:

Časté rýmy, otevřená pusa: to může mít na svědomí zvětšená mandle

Lékař radí

DAGMAR ČERŇANSKÁ

Příbram – Musí nosní mandle pokaždě ven, když se opakují infekce horních cest dýchacích? Na to a další otázky odpovídá specialistka ORL příbramské nemocnice MUDr. Andrea Hudcová.

Co je to nosní mandle a jakou má v našem těle funkci?
Nosní mandle, správně nosohltanová mandle, je tvořena lymfatickou tkání, která je součástí Waldeyerova lymfatického okruhu a vyrůstá z klenby nosohltanu. V našem těle má hlavně funkci imunologickou, působí jako filtr, jako první kontakt se škodlivými protitílkami (antigeny) virů a bakterií a funkci ochrannou, čili je to mechanická obrana částí horních cest dýchacích. Při opakových zánětech může dojít ke zbytnění (hypertrofii) nosní mandle a může se stát zdrojem opakování infekce, nebo být mechanickou překážkou v dýchání nosem.

Postihuje její zbytnění určitou skupinu dětí nebo na věku nzáleží?

Nosní mandli má dítě již při narození, postupně se zvětšuje. Typické zvětšení nosní mandle pozorujeme hlavně u dětí kolem 3. až 5. roku života, po 10. roce života dochází k postupné atrofii, v dospělosti její nález je vzácný.

Jak se zvětšená mandle projeví?

Pro děti se zvětšenou nosní mandli je typická nemožnost dýchat nosem, dýchají tedy ústy, což dokazuje typický tzv. tupý výraz tváře – facies adenoides – otevřené ústa, huhňavá řeč. Vlivem

špatného povrchního dýchání může dojít i k deformitě hrudníku. Mezi další příznaky patří noční chrápání někdy až apnoické pauzy, časté rýmy, častá nemocnost charakteru opakujících se respiračních infekcí horních a dolních cest dýchacích, středoušní záněty, porucha sluchu, může být patrná huhňavost, spojená s poruchou řeči, únavou, nepozorností. Některé děti trpí nočním pomocováním. Často jsou děti odesílané z ordinace stoma-

tologů pro špatný růst zubů nebo špatný skus.

Kdy je nutné s dítětem navštívit lékaře?

Určitě tehdy, když dítě trpí opakováně na některé z výše uvedených příznaků.

Jaká je následná léčba a je vždy nutné takovou mandli odstranit?

Děti s určitými příznaky je vždy nutné vyšetřit ORL specialistou, a to provést celkové ORL vyšetření, hlavně tzv. epifaryngoskopii, což je endoskopické

vyšetření nosní mandle, aby bychom vyloučili další možné příčiny obtíží. Součástí vyšetření by mělo být i alergologické případně imunologické vyšetření a zkoušit zahájení příslušné léčby. Při negativním alergologickém a imunologickém nálezu a při pozitivním objektivním ORL nálezu výše zmíněných projevů, je na místě mandli chirurgicky odstranit.

Pokud se mandle odstraňuje chirurgicky, co to obnáší pro

děti a jejich rodiče?

Chirurgické odstranění nosní mandle se řadí k tzv. jednodenní chirurgii. Na našem oddělení jeden den pacienty i s rodiči přijmeme, druhý den ráno je proveden zákrok a v odpoledních hodinách při bezproblémovém pooperačním průběhu pacienta propouštíme domů. Výkon se provádí v krátkodobé celkové anestezii, za endoskopické kontroly. Pooperačně dětičky přibližně tři hodiny nepřijímají žádné tekutiny ani stravu, příběžně jsou kontrolované, aby bychom vyloučili časné pooperační komplikace, nejčastějších krvácení. Po propuštění by měly být pacienti určiti v klidu, nepít horlké tekutiny, přijímat spíše nedráždivou stravu a být aspoň týden mimo dětský kollektiv..

Lze onemocnění předejít?

Každé dítě mělo přijímat do statek vitaminy, zejména vitamínu C, otužovat se, mělo by mít dost pohybu na zdravém vzduchu a oblékat se přiměřeně počasí. Pokud je to možné, v období epidemí omezit na minimum pobyt ve společných prostorách. Jinak včas absolvovat vyšetření ORL specialistou.