



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram
IČO: 27085031, telefon: 318 641 111

Informovaný souhlas s epidurální analgezií během porodu

Oddělení:

Jméno a příjmení pacienta:

Datum narození:

Jméno a příjmení zákonného zástupce/opatrovník:

Datum narození:

1. Informace o epidurální analgezií:

Epidurální analgezie znamená snížení nebo odstranění bolesti pomocí léků podaných do prostoru těsně nad tvrdou plenou míšní – tzv. epidurální prostor. Výkon provádí odborný lékař – anesteziolog. Epidurální analgezie významně sníží míru vnímání především ostré bolesti, zachová ale cití tlaku apod. Celkový vliv na rodičku nebo novorozence je minimální. Epidurální analgezií má smysl zavést jen v určité fázi porodu, pokud porod již příliš pokročil, není často tento typ analgezie již vhodný.

Anesteziolog Vás vyšetří před samotným zavedením katétru, následně provede zavedení katétru a poté určí ordinace léčiv podávaných do katétru.

Při zavádění epidurálního katétru se položíte na levý bok nebo sednete, anesteziolog Vám oře dezinfekcí malou oblast kůže nad bederní páteří. Poté s pomocí tenké jehly a lokálního anestetika znecitliví kůži a podkožní tkáň v oblasti vpichu epidurální jehly. Poté přistoupí k samotné punkci epidurálního prostoru speciální jehlou. Vnitřkem této jehly zavede do epidurálního prostoru tenký plastový katétr, který upevní náplastí ke kůži zad. Přítomnost samotného katétru v epidurálním prostoru nebudete cítit. Katétretem poté zdravotnický personál podává lokální anestetika – léčiva, která omezují vnímání citlivosti díky útlumu aktivity nervů v místě podání tohoto léčiva. Samotné zavedení katétru včetně všech příprav trvá jen několik minut. Účinek podaných anestetik – tj. úlevu od bolesti – pocítíte za zhruba 10-20 minut od podání. Budete i nadále cítit porodní stahy, nicméně intenzita bolesti bude nižší. Úplné znecitlivění není vhodné pro možné zpomalení porodu, tj. budete i nadále „něco cítit“, nicméně vše bude méně bolestivé. Se zavedeným katétretem můžete během první doby porodní měnit polohu, chodit, používat balón nebo jiné relaxační techniky kromě koupele. Po ukončení porodu personál katétr odstraní většinou ještě před Vaším odchodem z porodního sálu. V případě, že se v průběhu porodu ukáže jako nutný císařský řez, lze využít epidurální katétr k plné anestézii nutné k tomuto výkonu a eventuálně i k následné pooperační analgezií.

2. Očekávaný přínos:

Očekávaným přínosem je klidný a málo bolestivý až bezbolestný průběh porodu.

3. Rizika výkonu:

Komplikace jsou vzácné a pokud se vyskytnou, jsou většinou přechodné. V 1-3 % případů může dojít k proniknutí epidurální jehly přes tvrdou plenu do prostoru, kde je mozkomíšní mok a následně k úniku moku do epidurálního prostoru. Tento stav může být provázen bolestmi hlavy a někdy si vynutí aplikaci tzv. krevní zátky – malého množství vlastní krve do epidurálního prostoru. Případné bolesti zad v místě vpichu většinou přejdou za pár dnů.

Závažné komplikace jsou možné (krvácení, infekce, alergická nebo toxická reakce na lokální anestetikum), ale extrémně vzácné.

4. Alternativy výkonu

Svodná analgezie porodních cest – provádí porodník, celkově (systémově) podaná analgezie (opioidy, oxid dusný – „rajský plyn“), porod bez užití analgetických technik.

5. Možná omezení v důsledku výkonu

Nejsou jiná omezení než daná probíhajícím porodem.

6. Komu lze/nelze podat epidurální analgezi

Epidurální analgezi může mít každá rodička s výjimkou žen s alergií na některá lokální anestetika, žen s prodlouženou krevní srážlivostí, s infekčním ložiskem v místě vpichu. Opatrnost je na místě, pokud má žena tetování v místě vpichu. Při deformitách páteře nebo při výrazné obezitě může být zavedení katétru obtížnější.

7. Odpovědi na doplňující otázky pacientky + případná vyjádření pacientky.**Prosíme, informujte nás! Zakroužkujte správnou odpověď**

1. Měla jste již dříve anestézii? ANO NE
2. Došlo u Vás při anestézii k nějaké příhodě nebo zvláštní reakci? ANO NE
3. Máte nějakou alergii? Měla jste někdy alergickou reakci? ANO NE
4. Pokud ano, tak na jaké látky nebo léky:
5. Trpíte neurologickým onemocněním (včetně bolestí zad)? ANO NE

Souhlas pacienta/zákonného zástupce:

1. Souhlasím s podáním porodnické epidurální analgezie.
2. Byl/a jsem plně informována a poučena o možnosti vzniku komplikací.
3. Byla jsem informována a poučena, že léky či jiné látky, které užívám, mohou ovlivnit průběh porodnické analgezie a proto o nich musím informovat lékaře předem.
4. Byla jsem informována a poučena, že během podávání porodnické analgezie může dojít k náhlé změně zdravotního stavu, která si vyžádá překročení tohoto oprávnění. V těchto případech opravňuji lékaře k provedení všech postupů, které povedou k záchraně mého zdraví a života.
5. Dále prohlašuji, že lékař, který mi poskytl všechny potřebné informace a poučení mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto poučení a souhlasu, měla jsem možnost klást doplňující dotazy, které mi byly řádně zodpovězeny.

Já, níže podepsaná, po výše uvedeném seznámení prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky, možná rizika i komplikace plánovaného výkonu. Měla jsem možnost klást lékaři doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací. Konečně prohlašuji, že jsem lékaři sdělila veškeré okolnosti, týkající se mého zdravotního stavu/zastupované osoby a nezamlčela jsem nic, co by mohlo negativně ovlivnit výsledek výše uvedeného výkonu. Taktéž, že svůj souhlas s epidurální analgezi mohu kdykoli odvolat.

.....
datum podpis pacienta (zákonného zástupce/opatrovníka)

Prohlášení lékaře

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce/opatrovníka) srozumitelným způsobem informoval o porodnické analgezi a to včetně upozornění na možné komplikace. Případné poznámky lékaře:

.....
datum jméno a příjmení lékaře podpis lékaře